

TABELLA N. 2

“Sostanze medicinali” di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente

(Art.123, lett. a del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme -salvo diverse specificazioni nell'elenco- e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.

Nella presente tabella viene riportato:

- in carattere „,retto“ quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico,
- in carattere „,corsivo“ quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale.

<i>Ace-inibitori</i> (1)	<i>Cefalosporina p.i. (1)</i>
<i>Acetazolamide</i>	<i>Chinolonico orale</i> (1)
<i>Acetilcisteina</i>	<i>Codeina fosfato</i>
<i>Acido acetilsalicilico</i>	<i>Contraccettivi sistemici ormonali</i> (1)
<i>Acido tranexamico</i>	<i>Cortisonico orale</i> (1)
<i>Acqua depurata</i>	<i>Cortisonico p.i.</i> (1)
<i>Acqua sterile per preparazioni iniettabili</i>	<i>Diazepam p.i.</i>
<i>Adrenalina p.i.</i>	<i>Digossina</i>
<i>Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.</i>	<i>Eparinici p.i. (1)</i>
<i>Amiodarone</i>	<i>Eritromicina o altro macrolide</i>
<i>Ampicillina</i>	<i>Esteri nitrici per via sublinguale</i> (1)
<i>Antagonisti beta-adrenergici</i> (1)	<i>Estradiolo</i>
<i>Anticoagulanti cumarolici</i> (1)	<i>Etanolo 96 per cento</i>
<i>Antinfiammatori derivati dell'acido acetico</i> (1)	<i>Fenitoina</i>
<i>Antinfiammatori derivati dell'acido propionico</i> (1)	<i>Fenobarbital orale e p.i.</i>
<i>Antistaminici antiH1 orali e p.i.</i> (1)	<i>Fentanil transdermico</i>
<i>Antistaminici antiH2</i> (1)	<i>Flumazenil</i>
<i>Antiulcera inibitori della pompa acida</i> (1)	<i>Furosemide orale e p.i.</i>
<i>Benzodiazepina orale</i> (1)	<i>Garza idrofila di cotone sterile per medicazione</i>
<i>Calcio antagonisti diidropiridinici (1)</i>	<i>Gentamicina p.i.</i>
<i>Calcio antagonisti fenilalchilamminici</i> (1)	<i>Glucagone</i>
<i>Carbamazepina</i>	<i>Glucosio infusione endovenosa</i> (2)
<i>Carbone attivato</i>	<i>Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico</i>
<i>Cefalosporina orale</i> (1)	<i>Idrogeno perossido soluzione 3 per cento</i>
<i>Immunoglobuline umane antitetaniche</i>	<i>pralidossima metilsolfato p.i.</i>
<i>Insulina ad azione rapida p.i.</i> (1)	<i>Progesterone p.i.</i>
<i>Iodio</i>	<i>Salbutamolo aerosol</i>
<i>Ipecacuana sciroppo emetico</i>	<i>Scopolamina butilbromuro p.i.</i>
<i>Ipoglicemizzante orale</i> (1)	<i>Sierimmune antivipera</i> (3)
<i>Litio carbonato</i>	<i>Simeticone</i>
<i>Magnesio idrossido + Alluminio ossido idrato</i>	<i>Sodio bicarbonato</i>
<i>Magnesio solfato</i>	<i>Sodio citrato</i>
<i>Metoclopramide p.i.</i>	<i>Sodio cloruro</i>
<i>Morfina p.i., soluzione orale e solido orale</i>	<i>Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.</i> (2)

<i>Naloxone</i> <i>Ossigeno</i> <i>Oxicam derivati</i> ⁽¹⁾ <i>Paracetamolo</i> <i>Penicillina orale</i> ⁽¹⁾ <i>Penicillina p.i.</i> ⁽¹⁾ <i>Potassio ioduro</i>	<i>Sulfametoxazolo + trimetoprim</i> <i>(Co-trimossazolo)</i> <i>Tetraciclina</i> ⁽¹⁾ <i>Tramadolo</i> <i>Vaccino tetanico</i> ⁽¹⁾ <i>Vitamina K</i>
---	---

⁽¹⁾ Una del gruppo

⁽²⁾ Con idoneo dispositivo per infusione venosa

⁽³⁾ L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni

Nota. Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più comuni specifiche esigenze terapeutiche delle strutture